

Vakcinační schéma psa a kočky

Nejznámější a nejzákladnější součástí preventivní péče o domácí mazlíčky je vakcinace neboli očkování. Běžné infekce, které číhají na každém kroku na psy i kočky, jsou nebezpečné a mohou způsobit vážné onemocnění nebo dokonce smrt. Dobře provedená prevence je proto vždy lepším řešením než následná léčba.

Většina zvířat je v prvních týdnech života chráněna mateřskými protilátkami. Pasivní protilátky získané od matky postupně mizí ve stáří 8–12 týdnů klesnou obvykle na úroveň, která poté dovoluje aktivní imunoprophylaxi.

Základní vakcinační doporučení pro psy:

Věk imunizace	Onemocnění	Doporučení
Po 7. týdnu	Parvoviróza, psinka, parainfluenza, laryngitída (Nobivac DHPPi, platná rok)	Vakcinace nutná
Po 8. týdnu	Parvoviróza, psinka, parainfluenza, laryngitída/hepatitída, leptospiróza (Eurican DHPPi2-L, Vanguard 5/L – EU, platná rok)	Vakcinace nutná
Od 3 do 6 měsíců	Vzteklina (Rabisin, platná 3 roky)	Vakcinace povinná
Od 3 měsíců	Tetanus (Cloteid 4, platná 2 roky)	Vakcinace možná
Od 3 měsíců	Lymská borelioza (Merilym, platná rok)	Vakcinace možná
Od 3 měsíců	Plísňové onemocnění (Biocan M)	Vakcinace možná

Základní vakcinační doporučení pro kočky:

Věk imunizace	Onemocnění	Doporučení
Po 8. týdnu	Kaliciviróza, panleukopénie, infekční rhinotracheitída, chlamydióza (Purevax, platná rok)	Vakcinace možná
Po 9. týdnu	Kaliciviróza, panleukopénie, infekční rhinotracheitída (Versifel, platná rok)	Vakcinace nutná
Od 3 do 6 měsíců	Vzteklina (Rabisin, platná 3 roky)	Vakcinace možná
Po 9. týdnu	Virová leukémie (Leukocell 2 EU, platná rok, nutné předtím vyš. na protilátky)	Vakcinace možná
Po 16. týdnu	Infekční peritonitída (Primucell FIP, platná rok, nutné předtím vyš. na protilátky)	Vakcinace možná